

NØDPREVENSJON

Informasjon om nødprevensjon:

Norlevo

Det finnes to typer nødprevensjon (også kalt angrepille) på markedet. Denne informasjonen gjelder for merket Norlevo.

Nødprevensjon er ikke like sikkert som prevensjon, men kan hindre graviditet om du har hatt prevensjonssvikt. Bruk nødprevensjon hvis du har hatt samleie uten kondom, har hatt kondomsprekk (eller kondomet har glidd av) eller for eksempel du har vært på hyttetur uten p-pillene.

Norlevo virker hovedsakelig ved å utsette eggløsningen, og gjør at den kommer noen dager forsinket. Hvis eggløsningen har kommet før du tok Norlevo, vil nødprevensjonen trolig ikke ha effekt.

Norlevo har en effekt på ca. 65-70 %. Den har bedre effekt jo tidligere etter samleiet du tar den. Når det har gått mer enn 3 døgn etter samleiet, vil den trolig ikke ha effekt.

NÅR BØR NORLEVO IKKE BRUKES?

Hvis du bruker p-piller, minipiller, p-plaster, p-ring eller p-sprøyte, bør du derfor sjekke med apotek eller helsepersonell før du tar Norlevo.

Hvis du har hormonspiral eller bruker p-stav, skal du ikke bruke Norlevo.

Chat med oss eller les om ditt prevensjonsmiddel på www.sexogsamfunn.no for råd om nødprevensjon.

Bruk heller ikke Norlevo hvis du har brukt nødprevensjonen Ellaone for mindre enn 5 dager siden, da dette kan ødelegge effekten av nødprevensjonen.

BIVIRKNINGER

Den vanligste bivirkningen er kvalme. Ved å ta pillen sammen med mat kan du unngå kvalme. Hvis du kaster opp innen 3 timer etter at pillen er tatt, må du ta ny pille.

Andre bivirkninger av tablettene kan være hodepine, svimmelhet og ømme bryster.

Det er også vanlig å få blødningsforstyrrelser etter bruk av nødprevensjon. Neste menstruasjon kan komme tidligere eller senere enn forventet.

GRAVIDITETSTEST

Ta alltid en graviditetstest når du har brukt nødprevensjon. Du kan ikke stole på testen før det har gått 3 uker etter samleie uten kondom eller ved kondomsprekk (eller der kondomet gled av).